



Bulletin de préconisation n°9 du 26/06/26

Réalisé par le :

CENTRE
TECHNIQUE
de l'
Olivier

EN PARTENARIAT avec : les Chambres d'Agriculture (06, 20, 83, 11), CIVAM Oléicole 13, CIVAM bio 66, CIVAM 84, SIOVB, CETA d'Aubagne, Alex Siciliano, Groupement des Oléiculteurs du Vaucluse, Coopérative du Nyonsais, Célia Gratraud, Sébastien Le Verge.

RETROUVEZ LE BULLETIN INFOLIVE :

Sur le site internet de France Olive : <https://www.franceolive.fr/categorie/agronomie/inf-olive>

POUR UN ABONNEMENT GRATUIT À INFOLIVE, cliquez sur «je m'abonne» sur : <https://www.franceolive.fr/>

RÉSUMÉ DE LA SITUATION



Mouche

Les olives ont atteint le seuil d'attractivité dans tous les secteurs oléicoles (longueur > à 0,8 mm). Les piègeages restent faibles pour le moment.

Les pièges de suivi de population doivent être en place.

Pour ceux et celles qui ont choisi une stratégie de lutte par des applications d'argile, préparez-vous à faire la première application si ce n'est pas déjà fait.

Pour la lutte par piégeage massif, les pièges doivent être en place.



Cochenilles paulista

Le réseau d'observations des larves mobiles montre que sur les sites suivis, le pic d'essaimage est passé. Cependant, l'essaimage se poursuit et de jeunes stades continuent de se fixer sur les fruits. **Ce n'est pas le moment de traiter !**



Œil de paon et cercosporiose

Les conditions météorologiques annoncées ne sont pas favorables aux contaminations par les maladies du feuillage. Il n'est pas recommandé de réaliser des applications phytosanitaires pour le moment. **Soyez attentifs à l'évolution des prévisions météorologiques sur votre secteur et à votre contexte de production (humidité du verger, embrun marin, ...).**



Fertilisation

Continuez votre plan de fertilisation. Attention sur cette période, seule la fertilisation foliaire ou la ferti-irrigation sont efficaces. Ces derniers peuvent être mis en œuvre sur les vergers en cas de nécessité (complément alimentaire).

C'est la période d'apport de la potasse. La potasse permet de soutenir la formation des fruits. Ces apports sont à pondérer selon les résultats de vos analyses de sols et/ou de feuilles.

Mi-juillet, au durcissement du noyau, vous pourrez vérifier l'efficacité de vos apports en réalisant une analyse foliaire : consulter les actualités sur le [site internet de France Olive](https://www.franceolive.fr/) pour bénéficier comme chaque année du tarif préférentiel négocié par France Olive auprès du laboratoire SADEF. Pour plus d'informations [consultez l'InfOlive n°1](#).



Chaque dernier mercredi du mois à 18h, le pôle agronomie de France Olive anime une courte visioconférence : les 30 minutes agro ! Ce rendez-vous mensuel vous permet de venir échanger avec l'équipe de ce pôle et de poser vos questions techniques. Le prochain rendez-vous a lieu le 29 juillet 2026 où vous pourrez poser vos questions sur les analyses foliaires. [Le lien de connexion est accessible sur le site de France Olive.](#)



Irrigation

D'après les [bulletins Eau'Live n°6](#), les irrigations sont en cours sur tous les territoires oléicoles et pour quasiment tous les profils de sols. Nous sommes toujours à un stade sensible au stress hydrique. Soyez vigilants sur la gestion hydrique de votre verger.


InfOlive est une feuille d'information et de préconisation établie par le Centre Technique de l'Olivier, établissement agréé par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro LR01203, pour le compte de France Olive (association française interprofessionnelle de l'olive). Le Centre Technique de l'Olivier dispose d'un contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative, les informations présentées sur l'étiquette des produits ont valeur de loi. ISSN : 2264 - 6701

Travaux financés par l'Union européenne, FranceAgriMer et France Olive Production.





Mouche de l'olive



Biologie

Retrouvez plus d'informations sur la biologie de la mouche de l'olive sur le [BSV n°8](#).

Observations et évaluation du risque

D'après le [BSV n°9](#), le stade olive attractive (longueur de 0,8 mm) est atteint sur l'ensemble des secteurs oléicoles français. Sur le réseau de piégeage installé, les captures de mouches sont toujours faibles sur l'ensemble du territoire, comme lors du dernier bulletin.

Les niveaux de piégeage à la même période l'an dernier étaient similaires.

	Longueur olives > 8 mm	Longueur olives < 8mm
Mouche(s) capturée(s)	Risque élevé	Vigilance renforcée
Aucune mouche capturée	Vigilance renforcée	Risque faible

Préconisations

Lutter contre les dégâts de mouche permet de limiter les dégâts dus à la dalmaticose. Afin de positionner au mieux vos mesures de lutte, il est recommandé de mettre en place des pièges de suivis de population des mouches (chromatique ou alimentaire).

Actuellement, plusieurs méthodes de lutte sont possibles :


- Par **piégeage massif** qui permet de capturer les mouches grâce à des pièges alimentaires (piège bouteille). Des indications sur la fabrication et la mise en place des pièges sont disponibles sur le site de France Olive. Les pièges doivent être en place avant le stade « olive attractive » et les premiers vols. Cette stratégie est recommandée pour les parcelles isolées (non entourées d'autres vergers d'oliviers), et est fortement déconseillée si votre verger est entouré de parcelles d'oliviers traitées à l'argile,
- Par applications de **barrière minérale**. Ces dernières doivent être positionnées en préventif. La première application doit être faite au stade « olive attractive ».



Les barrières minérales				
Spécialité commerciale	Matière active	Dose homologuée	Nombre d'applications par an	Remarque
AGRI JARDIN FRUCTIFIA	99 % d'argile kaolinite calcinée (kaolin)	3 g/m ²	6	Renouvellement en fonction de l'augmentation du calibre des fruits, du lessivage par les précipitations (20 mm) et de l'érosion par le vent.

Pour plus d'informations, consultez [le cahier de l'oléiculteur 2026](#).

Chaque dernier mercredi du mois à 18h, le pôle agronomie de France Olive anime une courte visioconférence : les 30 minutes agro ! Ce rendez-vous mensuel vous permet de venir échanger avec l'équipe de ce pôle et de poser vos questions techniques. Le prochain rendez-vous a lieu le 29 juillet 2026 où vous pourrez poser vos questions sur la mouche de l'olive. [Le lien de connexion est accessible sur le site de France Olive.](#)



Cochenilles paulista

Biologie



Cochenille de la famille des Diaspididae
(source Fanny Vernier CA83)

Retrouvez plus d'informations sur la biologie des cochenilles *Acutaspis paulista* [sur le BSV n°6](#).

Observations et évaluation du risque

D'après le [BSV n°9](#), les foyers d'*Acutaspis paulista* mentionnés dans les bulletins précédents sont toujours présents sur le littoral varois et les Pyrénées-Orientales.

Le suivi du réseau d'observations des larves mobiles sur des parcelles atteintes dans le Var se poursuit : les parcelles suivies sont situées à Hyères, Carqueiranne, La Cadière-d'Azur, La Ciotat, Sauvebonne, La Londe-les-Maures, Sanary-sur-mer.

Les observations de ce réseau de parcelle confirment que le pic est passé. En revanche, l'essaimage n'est pas terminé puisque de jeunes stades larvaires se fixent progressivement sur les olives. Sont toujours observées des femelles avec des pontes et/ou de jeunes larves sous les boucliers.

Le risque évalué est **fort** à **très fort** si des foyers de cochenilles paulista sont présents sur la parcelle. Le risque est **faible** si vous n'observez pas de foyers.

Les risques annoncés correspondent aux risques potentiels connus des rédacteurs et ne tiennent pas compte des spécificités de votre exploitation.

Les observations sont réalisées dans le cadre du suivi biologique du territoire par les techniciens référents sur les départements oléicoles des régions Sud – Provence Alpes Côte d'Azur, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie. Ces observations sont transcrites dans le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) ou capitalisées lors de rencontres téléphoniques avant la rédaction de chaque bulletin InfOlive.

Les produits phytopharmaceutiques sont employés conformément aux règles fixées par l'arrêté du 7 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative, les informations présentées sur l'étiquette des produits ont valeur de loi.



APPEL À VIGILANCE

Bien que cette cochenille ne soit pas réglementée, elle est considérée comme un ravageur émergent important dans la filière oléicole. Afin de connaître l'étendue de sa dissémination, il est primordial de faire remonter toute observation ou suspicion de sa présence auprès de France Olive (contact@franceolive.fr).

Préconisations

Favoriser la biodiversité pour permettre la présence naturelle d'insectes prédateurs ou parasitoïdes : conserver si possible une couverture végétale, favoriser les haies composites, ... De nombreuses coccinelles prédatrices *Exochomus quadripustulatus* ont été observées dans les vergers fortement infestés.

D'après les observations sur le réseau de parcelles, le pic d'essaimage est passé. L'essaimage se poursuit et de jeunes stades larvaires continuent de se fixer sur les fruits.

Ce n'est pas le moment de traiter puisque le pic d'essaimage est passé.



Maladies du feuillage

Biologie



Symptômes d'œil de paon
(source France Olive)

Symptômes de cercosporiose
(source France Olive)

Retrouvez plus d'informations sur la biologie de l'œil de paon et de la cercosporiose [sur l'InfOlive n°1](#).

Observations et évaluation du risque

D'après le [BSV n°9](#), les symptômes de cercosporiose continuent d'apparaître et des feuilles de l'année passée touchées par la cercosporiose jaunissent puis chutent en ce moment dans les Pyrénées-Orientales, du sillon audois à la basse vallée du Rhône, dans le Nyonsais et les Baronnies.

Quelques sorties tardives d'œil de paon sont observées dans le sillon audois.

Aux vues des prévisions météorologiques annoncées, le risque est **faible** pour la cercosporiose et l'œil de paon.

Le risque évalué est valable à court terme. Il est basé principalement sur les observations récentes des techniciens partenaires du réseau d'observation piloté par France Olive, et des conditions météorologiques prévisionnelles. Ce risque est à pondérer avec d'autres paramètres comme l'inoculum présent dans vos parcelles, la défoliation ou la sensibilité variétale, et ne prend pas en compte le niveau de protection des parcelles.

Pour vous aider, vous pouvez utiliser le modèle de prédiction des contaminations à l'œil de paon sur vos parcelles sur l'application Oléiculteur téléchargeable ici :

<https://www.franceolive.fr/categorie/agronomie/acces-a-l-application-oleiculteur>



Les observations sont réalisées dans le cadre du suivi biologique du territoire par les techniciens référents sur les départements oléicoles des régions Sud – Provence Alpes Côte d'Azur, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie. Ces observations sont transcrites dans le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) ou capitalisées lors de rencontres téléphoniques avant la rédaction de chaque bulletin InfOlive.

Les produits phytopharmaceutiques sont employés conformément aux règles fixées par l'arrêté du 7 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative, les informations présentées sur l'étiquette des produits ont valeur de loi.



Préconisations

Avant toute intervention phytosanitaire, il est recommandé de :

- de favoriser la pousse végétative et le renouvellement foliaire par un itinéraire cultural adapté,
- Régler votre pulvérisateur afin d'optimiser la qualité d'application des traitements,
- D'entretenir votre parcelle : la gestion de l'enherbement et des haies permet de limiter la présence d'humidité dans le verger.

Les conditions météorologiques annoncées ne sont pas favorables aux contaminations par les maladies du feuillage. Il est préférable de garder des applications phytosanitaires pour les périodes à hauts risque comme l'automne.

Restez cependant attentifs aux prévisions météorologiques.